

СЛУХОВАТА ЗАГУБА: СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМО ЗАБОЛЯВАНЕ

Намаленият слух е сериозен проблем за всяка възраст. От раждането до дълбока старост слуховите способности определят до голяма степен възможностите за социална реализация на всеки от нас.

Причините

, водещи до намаление или загуба на слуха са много

, но могат да се разделят на :

- вродени
 - придобити:
 - възпалителни заболявания (вирусни и бактериални инфекции) на горните дихателни пътища
- и

ушите
,
които
са
много
чести
и при
които
обикновено
се
прибягва
до
самолечение
, без
да
се
предполага
,
че
появилото
се
заглъхване
(
често
придружено
от
шум в
ушите
) е
признак
на
трайно
слухово
увреждане

.

- съдови нарушения - при боледуващи от захарна болест (диабет), високо кръвно налягане
(
хипертония
)
,
сърдечни
заболявания

.

- травми в областта на главата;

- туморни образувания в ухото или по хода на слуховия нерв.
- работа в шумна среда (над 85 dB) - продължителен престой при такива условия
води
до
тежки
поражения
на
слуховия
нерв
,
които
са
невъзвратими
.

- звукова травма: предизвиква се от краткотрайно, но силно звуково дразнене - х
върлена
наблизо
бомбичка
,
изстрел
,
мощна
стереоуредба
(
особено
в
дискотеките
).

Независимо от горепосочените причини, независимо от степента на намаление на слу
ха
,
появата
на
такъв
симптом
е
основателен
повод
за
консултация
с
УНГ-специалист

.
Само
след
обстоен
преглед
и
аудиограма
(
апаратно
изследване
на
слуха
),
може
да
се
установи
причината
и
типа
на
слуховото
увреждане
. При
засягане
от
проводен
тип (
ангажирано
е
средното
ухо), при
правилно
лечение
настъпва
възстановяване
без
последници
за
слуха
. При
засягане
от
приемен
тип (
ангажиран

е
слуховият
нерв
)
степента
на
повлияване
от
приложеното
лечение
зависи
много
от
това
кога
е
започнато
то
и ако
се
вземат
мерки
веднага
,
може
да
се
разчита
на
възстановяване
на
слуха
. При
забавяне
от
няколко
дни или при
самолечение
има
голям
риск
от
получаване
на
трайна
слухова

загуба

.